

**GRILLE D'AIDE
A LA DELIVRANCE DES AVK**

Cachet

Date :/...../.....

Les items **surlignés** ne sont à renseigner que :

- lors d'une initiation de traitement par AVK

- lors de l'utilisation de la grille pour la 1^{re} fois à l'officine (pour tous les patients traités par AVK, y compris ceux traités depuis longtemps)

PATIENT

Nom :

Le patient porte toujours sur lui une carte signalant qu'il est traité par AVK ou une ordonnance mentionnant son traitement :

Oui Non -> **Remise d'une carte** (jointe dans le carnet de suivi des AVK)

Un carnet d'information et de suivi des AVK a déjà été remis au patient :

Oui Non -> **Remise et explication du carnet d'information et de suivi des AVK avec le patient**

TRAITEMENT

Date de l'ordonnance :/...../.....

Initiation de traitement -> **Parcourir avec le patient le carnet d'information et de suivi des AVK** Renouvellement


Changement de posologie -> **Suivre l'INR !**

Préviscan Sintrom Mini-Sintrom Coumadine 2 mg Coumadine 5 mg

Posologie :

DÉTECTION DES SITUATIONS À RISQUE

Dans le cas d'une prise par jour, le médicament AVK est pris :

Le soir (toujours dans les mêmes conditions : avant, pendant, après le repas) A un autre moment  **Médecin**

Un contrôle biologique de l'INR est réalisé régulièrement (au moins 1 fois par mois) :

Oui Non  **Médecin** ± *opinion pharmaceutique*


Le patient connaît son INR cible :

Oui Non -> **Inviter le patient à questionner son médecin et l'indiquer dans le carnet**

Le patient connaît la démarche à suivre en cas d'INR avec une valeur anormale :

Oui Non -> **EXPLICATIONS** *au patient*


Lors de l'initiation d'un traitement par AVK pour traiter une thrombose veineuse profonde, l'AVK est pris en même temps qu'un traitement par héparine (dans le cadre d'un relais héparine/AVK) :

Oui -> **Suivre l'INR** Non  **Médecin** *héparine nécessaire*

Le patient présente des signes tels que :

<input type="checkbox"/> Gingivorragie	<input type="checkbox"/> Epistaxis	} Suivre l'INR !	<input type="checkbox"/> Hématurie	} Urgence possible
<input type="checkbox"/> Hématome	<input type="checkbox"/> Hémorragie conjonctivale		<input type="checkbox"/> Douleurs abdominales	
<input type="checkbox"/> Aucun de ces signes	<input type="checkbox"/> Autre saignement		<input type="checkbox"/> Hémoptysie, hématomèse	

Le patient associe à son médicament AVK un des médicaments suivants contre-indiqués :

Aspirine à forte dose (≥ 3 g/j)* Miconazole (Daktarin gel buccal) Millepertuis (*Hypericum perforatum*)
->  **Médecin** ± *opinion pharmaceutique*

Le patient sous AVK change de traitement associé (d'automédication ou de prescription) :

Mise en place d'un nouveau traitement Arrêt d'un médicament Modification de la posologie d'un médicament

-> **Suivre l'INR régulièrement jusqu'à stabilisation**

Validée par **Qualité** **Le**/...../.....